



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление**

**Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по  
Тюменской области**

**(Управление Роспотребнадзора по  
Тюменской области)**

Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026

Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92

E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru

<http://www.72.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,

ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

10.05.2023

№ 72-00-03/09-5249-2023

*Министерство  
для работы  
11.05.2023*

Главам муниципальных  
образований

(по списку)


*Исидорова Т.М.,  
Казанцева С.А.,  
Айрипу Д.Н.,  
Кравченко Л.К.,  
Мартышкин В.В.  
в работу*

Согласно п.3 протокола рабочего совещания по вопросу эпидемиологической ситуации по кори в Тюменской области от 28.04.2023 г., Управление Роспотребнадзора по Тюменской области направляет памятку по профилактике кори для проведения разъяснительной работы среди населения.

Приложение: на 1 л в 1 экз.

Врио руководителя,  
главного государственного санитарного  
врача апс Тюменской области

А.В. Накатаев



Мыщик Е.Н.  
8(3452)203447



### **Профилактика кори.**

Корь - вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к кори очень высокая. Лица, не болевшие корью и непривитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте. Клинически корь протекает с высокой температурой до 40 °С, насморком, конъюнктивитом. С 4-5 дня заболевания появляется сыпь. Характерна этапность высыпания – сначала сыпь появляется за ушами, на лице и шее, далее – грудь и туловище, затем – на руках и ногах.

Корь опасна прежде всего возможными серьезными осложнениями. Осложнения при кори характеризуются большим разнообразием. Поражение вирусом кори слизистой оболочки респираторного тракта может приводить к развитию бронхита, ларингита (возможен стеноз гортани), а также обусловить наиболее частое осложнение кори - пневмонию. На втором месте поражение желудочно-кишечного тракта (стоматит, энтероколит). Самыми тяжелыми осложнениями являются осложнения со стороны центральной нервной системы (энцефалит, менингит). Заболевание очень опасно для беременных. Заболевание корью во время беременности повышает риск преждевременных родов, повышения вероятности спонтанных аборт.

Единственной радикальной мерой, способной защитить от заболевания корью является вакцинация. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок вакцинация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев, ревакцинация - в 6 лет. Плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет прививаются лица из «групп риска» - работники лечебно-профилактических и образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, работники транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом. Лица, не привитые ранее против кори и не переболевшие корью, прививают двукратно с интервалом не менее 3 месяцев между прививками. Устойчивый иммунитет формируется после двукратного введения вакцины.

Сделав прививку от кори, человек защищает себя и окружающих лиц от заболевания!

